



Amino fish

Fertilizante Líquido
Compuesto a base de productos orgánicos



Descripción:

AMINOFISH® es un Biofertilizante, a base de compuestos orgánicos, formulado a base de extractos solubles de pescado, que aporta un complejo de macro y micronutrientes, aminoácidos, aceites esenciales y proteínas, que son rápidamente asimilables y que promueven un buen desarrollo de la planta.

La presencia de grupos funcionales, hacen de Aminofish® un producto que actúa en sinergia con otros elementos, al facilitar su absorción y penetración a la planta.

Modo de acción:

Aminofish® activa en la planta los procesos fisiológicos de su metabolismo tales como el transporte de fotosintatos, activación enzimática y activación de mecanismos de defensa, también participa con la aportación de elementos nutricionales importantes en etapas de floración y fructificación.

Beneficios:

- * Incrementa la resistencia a estrés.
- * Evita el consumo excesivo de energía y reservas.
- * Regenera los tejidos vegetales.
- * Fortalece a la planta contra el ataque de hongos y plagas.
- * Mayor desarrollo.
- * Mejora los niveles de clorofila.
- * Aumenta productividad.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% POR PESO
Proteína.....	20.00 %
Zinc (Zn).....	0.500 %
Manganeso (Mn).....	0.500 %
Óxido de Magnesio	
MgO.....	0.410 %
Molibdeno (Mo).....	0.020 %
Hierro (Fe).....	0.050 %
Cobalto (Co).....	0.005 %
Acondicionadores e inertes.....	78.515 %
TOTAL.....	100.00 %

Recomendaciones de Uso:

AMINOFISH® se puede aplicar vía suelo y foliar. La aplicación foliar del producto debe ser preferentemente en las primeras horas del día o bien por la tarde, después de las horas de intenso calor, para favorecer la permanencia y absorción del producto sobre las hojas y demás órganos aéreos de las plantas.

CULTIVO	DOSIS L/Ha	INTERVALOS DE APLICACIÓN
Piña (Ananas comusus)	1-2L/Ha en semilleros	Después de herbicidas
Papaya (Carica papata)	500cc - 1L/Ha	15 a 21 días o después de un estrés de intoxicación
Banano (Musa spp)	500cc - 1L/Ha	Cada 15 días
Arroz (Oryza sativa)	1L/Ha	Aplicar al amacollamiento y al llenado
Maíz (Zea mays L)	1L/Ha	Cada 20, 30 y 40 días
Hortalizas Ornamentales	1L/Ha	Cada 15 o 21 días Cada 15 días
Cacao (Theobroma cacao L)	500cc/Ha	Cada 15 días

