

**FICHA TÉCNICA**  
**JEQUE**  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL 133-F2/NA-CL1  
Titular del Registro: AGROQUIM C. LTDA.

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

**Ingrediente activo**

Metalaxyl..... 150 g/l

Propamocarb..... 100 g/l

Fungicida sistémico curativo y erradicante de amplio espectro con acción bioestimulante que contiene Metalaxil + Propamocarb, para el control de Lancha, tizón temprano, mildiú vellosa en varios cultivos.

**CARACTERÍSTICAS**

**JEQUE** es un fungicida que tiene en su formulación dos fungicidas sistémicos evitando que la enfermedad no desarrolle resistencia, además tiene un efecto bioestimulante y no produce efecto manchado en hojas, flor y frutos. El Metalaxil es un fungicida sistémico que inhibe la síntesis del ácido ribonucleico (ARN), inhibe síntesis de proteínas, suprime formación de esporangios y no permite el establecimiento de infecciones. El Propamocarb tiene acción fungistática y afecta la permeabilidad de la membrana celular.

**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS**

| I.A.        | MOA                             | Sitio de acción              | Cód. Sitio de Acción FRAC | Grupo FRAC | Grupo Químico | Por su rango de acción                                  |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|---------------|---|
| Metalaxyl   | Síntesis de ácidos nucleicos    | ARN Polimerasa 1             | A1                        | 4          | FENILAMIDA    | Sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante |
| Propamocarb | Síntesis de lípidos y membranas | Permeabilidad de la membrana | F4                        | 2B         | CARBAMATO     | Sistémico con acción curativa                           |

## RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO      | PLAGA   | DOSIS         | FRECUENCIA DE APLICACIÓN   |
|--------------|---|---------------|--|
| Ornamentales | Velloso ( <i>Peronospora sparsa</i> )<br>Pythium ( <i>Phytium</i> ) | 1-1.5<br>cc/L | 2 veces a la semana con un intervalo de 3 días, posterior continuar la rotación con fungicidas que posean diferentes mecanismos de acción. |

**MANEJO ANTIRRESISTENCIA:** Para reducir el riesgo de desarrollar resistencia, se recomienda aplicar JEQUE en rotación con fungicidas registrados que posean diferente mecanismo de acción.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Puede mezclarse con la mayoría de agroquímicos existentes en el mercado, sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de su uso. El producto no es fitotóxico a la dosis recomendada. No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina como sulfato de calcio, sulfato de cobre.

**TOXICIDAD:** Categoría toxicológica II (Franja amarilla). Moderadamente Peligroso.

**AVISO AL COMPRADOR:** El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN:** Llamar a la línea gratuita 1800 – veneno (836366) o CITOX (02) 2905162; CIATOX (04) 2451022.

Para mayor información comunicarse con el personal técnico de IMPORTAGRIFLOR. Panamericana Norte Km 4 ½ vía Tabacundo - Cayambe. Parque Industrial San Mateo local 19B. Telfs: (02)2110121/ 2110122 /2110807

**PRECAUCIONES:** Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

**PRESENTACIÓN:** Frasco x 1 litro.

**IMPORTADOR:** AGROQUIM

**DISTRIBUIDO POR:** IMPORTAGRIFLOR